



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

II. Joannis Keill *M. D. & in Academia Oxoniensi Astronomia Professoris Saviliani, Observationes in ea qua edidit Celeberrimus Geometra Johannes Bernoulli in Commentariis Physico Mathematicis Parisiensibus Anno 1710. de inverso Problemate Virium Centripetarum. Et ejusdem Problematis solutio nova.*

Nobilissimum est problema Datâ lege Vis centripetæ invenire Curvam quam describit Mobile, de loco dato, secundum datam rectam, & cum data velocitate egrediens Concessis figurarum curvilinearum quadraturis, ejus solutionem perfectam olim dedit Dominus *Newtonus* in *Principiis Philosophiæ Mathematicis*. Hoc ipsum Problema denuo aggressus est vir clarissimus & Geometra celeberrimus Dominus *Johannes Bernoulli* in *Academia Basiliensi* Matheseos Professor *, qui non pauca eaque egregia ingenii sui specimina jam pridem edidit, quibus Geometriam reconditiorem non parum ditavit. Unde a tanti viri acumine novam pulchramque Problematis solvendi methodum expectabam. Gestiebam itaque solutionem Bernoullianam perlegere, & cum Newtoniana comparare; quibus tandem diligentius perlectis & examinatis, hæc quæ sequuntur annotavi.

Dominus Bernoulli eandem præmittit propositionem quam *Newtonus* problemati demonstrando prius adhibuit: estque ea in *Principiis* XL, non minus pulchra quam demonstratu facilis. Scil.

Si corpus cogente vi quacunque centripeta moveatur utcumque, & corpus aliud recta ascendat vel descendat, sintque eorum velocitates, in aliquo æqualium altitudinum casu, æquales; velocitates eorum in omnibus æqualibus altitudinibus erunt æquales.

* Vide Commentarios Physico-mathematicos Parisienses Anno 1710.

Hujus propositionis Demonstrationem Newtonianam ait Bernoullius esse nimis implicatam, & suam, quam simpliciorē vocat, ejus loco substituit. At pace tanti viri liceat mihi dicere, si quid discriminis sit inter demonstrationem Bernoullianam & Newtonianam, id in eo situm est, quod hæc multo facilior esse videtur minusque perplexa quam illa. *Fig. I.* Nam si centro *C* describantur circuli *DI*, *EK*, quorum intervallum *DE* est quam minimum, sintque corporum in *D* & *I* velocitates æquales, & ab *N* ad *IK* demittatur perpendiculum *NT*, fusc ostendit Newtonus vim acceleratricem secundum *DE*, esse ad vim acceleratricem secundum *IK* ut *IN* ad *IT*. Nimirum si vis secundum *DE* vel *IN* exponatur per rectas *DE* vel *IN*, vis illa secundum *IN* resolvitur in duas *TI*, *TN*, quarum illa solum quæ est ut *TI* motum secundum directionem *IK* accelerat: accelerationes autem seu velocitatum incrementa sunt ut vires & tempora quibus generantur conjunctim. At tempora ob æquales velocitates in *D* & *I*, sunt ut viæ descriptæ *DE*, *IK*; quare accelerationes in decursu corporum per lineas *DE* & *IK*, sunt ut *DE* ad *IT* & *DE* ad *IK* conjunctim; i. e. ut *DE* quad. quod est *IN* quad. ad rectang. *IT* × *IK*. adeoque ob *IN* quad. = *IT* × *IK*, incrementa velocitatum sunt æqualia: æquales igitur sunt velocitates in *E* & *K*, & eodem argumento semper reperientur æquales in æqualibus distantiiis. Hæc est summa demonstrationis Newtoni quæ tam dilucide ab eo exponitur, ut inter propositiones elementares paucas faciliores invenies. At non sic procedit Dominus Bernoullius, sed illi sufficit dicere, Mechanicam ostendere vim secundum *DE* esse ad vim secundum *IK*, ut *IK* ad *DE*. Mechanicam etiam ostendere incrementa velocitatum esse in ratione virium & temporum conjunctim; & initio motus positis velocitatibus æqualibus tempora sunt ut viæ descriptæ *DE*, *IK*; & hinc, (argumento prorsus simili ei quo utitur Newtonus) concludit incrementum velocitatis, quod acquirit corpus dum describit *IK*, esse ad incrementum velocitatis dum describitur *DE*, ut *DE* × *IK* ad *IK* × *DE*, & proinde velocitatum incrementa ubique in distantiiis æqualibus esse æqualia.

At si Tyronibus facilem voluisset tradere demonstrationem, debuisset Propositionem Mechanicam citare, eamque ad præsentem casum accommodare. Et quidem pluribus verbis opus est, ut hoc fiat per theorema quod innuere videtur, in quo agitur de descensu Gravium in planis inclinatis : nullum enim est hic Planum datum quod recto corporum descensui obstat ; immo tantum abest ut corpus à plano cohibeatur, ut è contra à Plano seu Tangente per vim quandam continuo retrahitur. Proculdubio igitur manifesta magis foret ejus ratiocinii vis, si demissis Mechanicæ propositionibus, rem omnem ex propriis principiis demonstrasset, uti fecit Newtonus. Nam resolvendo triang. rectang. KNI in duo triangula æquiangula, est KI ad IN ut IN ad IT , adeoque loco rationis IN ad IT ponere potuisset rationem KI ad IN vel ad DE .

Si de loco quovis A in recta AC cadat corpus, deque loco ejus E erigatur semper perpendicularis EG vi centripetæ proportionalis, sitque BFG linea curva quam punctum G perpetuo tangit ; demonstrat Newtonus velocitatem corporis in loco quovis E esse ut Areae curvilineæ $ABGE$ latus quadratum. Adeoque si velocitas dicatur v , erit v^2 ut Area $ABGE$: & si P sit altitudo maxima, ad quam corpus in Trajectoria revolvens, deque quovis ejus puncto eâ quam ibi habet velocitate fursum projectum ascendere possit : sitque quantitas A distantia corporis à centro, in alio quovis orbitæ puncto ; & vis centripeta sit semper ut ipsius A dignitas quælibet, scil. ut A^{n-1} , Velocitas corporis in omni altitudine A erit ut $\sqrt{nP^n - nA^n}$.

Similiter Dominus Bernoullius ostendit, si distantia à centro dicatur x , velocitas v & vis centripeta ϕ , esse $v = \sqrt{ab - \int \phi x}$ ubi ex Quadraturis constat esse Aream $ABGE = ab - \int \phi x$. Perinde itaque est sive exprimatur quadratum velocitatis per Aream $ABGE$, sive per quantitatem huic æqualem $ab - \int \phi x$. Et si vis centripeta ϕ sit ut nA^{n-1} seu $n x^{n-1}$, sit $ab = P^n$ &

$\varphi x = A^n$, adeoque $ab - \varphi x$ est ut quantitas $P^n - A^n$.

Describat corpus Curvam VK , vi centripeta tendente ad C , deturque circulus VXY , centro C intervallo quovis CV descriptus.

Q sit quantitas constans, atque $\frac{Q}{A} = z$. Sitque KI elementum Curvæ; IN vel DE elementum altitudinis, XT elementum arcus : demonstrat Newtonus Elementum arcus seu XT

exprimi posse per hanc formulam $\frac{Q \times IN \times CX}{AA \sqrt{ABGE - z^2}}$. Similiter

ex præmissis Dominus Bernoullius, posito Arcu $UX = z$, & altitudine seu distantia $= x$, elementum arcus ad hanc reducit formulam scilicet $z = \frac{a^2 c x}{\sqrt{abx^4 - x^4 \varphi x - a^2 c^2 x^2}}$. Et primo quidem as-

pectu videbatur formula Newtoniana quodammodo simplicior Bernoullianâ, eo quod paucioribus constat terminis ; at re diligentius exploratâ, vidi Bernoullianam formulam omnino cum Newtoniana coincidere ; nec nisi in notatione quantitatum ab ea differre. Nam si pro $ab - \varphi x$ ponatur $ABGE$, pro a ponatur Q , & x pro A , a pro CX , & x pro IN , fit

$$\frac{a^2 c x}{\sqrt{abx^4 - x^4 \varphi x - a^2 c^2 x^2}} = \frac{Q \times CX \times IN}{\sqrt{A^4 \times ABGE - \frac{Q^2 A^4}{A^2}}} =$$

$$\frac{Q \times CX \times IN}{AA \sqrt{ABGE - \frac{Q^2}{A^2}}} \text{ seu ponendo } z^2 \text{ loco } \frac{Q^2}{A^2}, \text{ (quod facit}$$

Newtonus commodioris notationis gratia,) Formula Bernoulli-

ana evadit $\frac{Q \times CX \times IN}{A^2 \sqrt{ABGE - z^2}}$: unde constat formulam illam

non magis à Newtoniana discrepare, quam verba Latinis literis expressa differunt ab iisdem verbis scriptis in Græcis characteribus.

Post traditam generalem formulam ; descendit Dominus Bernoullius ad casum particularem, ubi vis centripeta est reci-

procè

procè ut quadratum distantiae; & per varias reductiones & operationes satis molestas, constructionem ostendit Curvarum quæ urgente eâ vi centripeta describi possunt, easque ad æquationes reducendo probat esse Sectiones Conicas. Deinde queritur Dominum Newtonum supponere sine demonstratione Curvas à tali vi descriptas esse Sectiones Conicas.

Impossibile est ut credat nullam Newtono notam fuisse hujus rei demonstrationem; Noverit enim eum primum & solum fuisse qui hanc omnem de vi centripeta doctrinam geometricè tractavit, quique eam ad tantam perfectionem perduxit, ut post plures quam viginti annos, parum admodum à præstantissimis Geometris ei additum sit. Noverit etiam Bernoullius Newtonum, præter generalem problematis inversi solutionem, ostendisse modum quo formari possunt Curvæ, quæ vi centripeta decrescente in triplicata distantiae ratione describuntur, adeoque alterum illum casum ignorare non potuisse. Nec profecto intelligo qua ratione Bernoullius Newtono obijciat, eum hujus casus demonstrationem prætermisisse; cum ipse non pauca sæpius proposuit Theoremata, quorum demonstrationes nusquam dedit; & quidni liceat Newtono ad alia festinanti hoc idem facere. Interim in nova *Principiorum* Editione, facilius multo & magis clara, licet tribus verbis, extat hujus rei demonstratio, quam est Bernoulliana.

Tandem Bernoullius ut necessitatem suæ demonstrationis inversi Problematis in hoc particulari casu ostendat, hæc addit. Considerandum est, inquit, quod vis quæ facit ut corpus in Spirali Logarithmica moveatur, debet esse reciprocè ut cubus distantiae à centro; at non inde sequitur talibus viribus semper describi debere tales Curvas, cum similes etiam vires facere possunt ut corpus in Spirali Hyperbolica moveatur.

Miror sane quod Vir Cl. suspicetur Newtonum talem unquam duxisse consequentiam. Nam præter Spiralem logarithmicam, ostendit Newtonus qua ratione aliæ Curvæ, numero infinitæ & diversæ, formari possunt, quæ omnes describantur eadem vi centripeta qua Spiralis Logarithmica; interque eas reponi debet hæc ipsa Spiralis Hyperbolica, ut in sequentibus ostendemus.

Exinde

Exinde autem concludit Newtonus Sectiones tantum Conicas necessario describi debere per vim centripetam quadrato distantiae reciprocè proportionalem: Nempe quod Curvatura orbitae cujuscunque ex datis velocitate, vi centripeta & positione Tangentis datur; datis autem umbelico, puncto contactus & positione tangentis, semper describi possit Sectio Conica quæ curvaturam illam datam habeat. Hoc à me ostensum est in Actis Philosophicis Londinensibus Anno 1708. In hac igitur Sectione, urgente illa vi corpus movebitur, & in nulla alia; cum corpus de eodem loco, secundum eandem directionem, eadem cum velocitate, & urgente eadem vi centripeta exiens, non possit diversas semitas describere.

Liccat jam mihi Dominum Bernoullium imitari, & inversum de vi centripeta problema longe diversa methodo resolvere, & ad casum particularem applicare; ubi scil. vis est reciprocè ut cubus distantiae, simulque ostendere demonstrationem Cor. 3. prop. 41. *Principiorum* Newtoni.

Quod ut fiat, quædam ex iis quæ in Actis Philosophicis No. 317. exposui hic præmittenda sunt. *Fig. II.*

Sit *VIL* Curva quævis, quam corpus urgente vi centripeta ad centrum *C* tendente describit: hanc Curvam in duobus punctis infinite vicinis *I* & *K* tangant rectæ *IP*, *Kp*, ad quas è centro demittantur perpendiculares *CP*, *Cf*; centro item *C* describantur *KE*, *ID*, & ducatur *CI*.

Erit vis centripeta ut Quantitas $\frac{Pp}{PC^3 \times IN}$ Quod Theorema li-

cet in prædicto loco demonstravimus, ecce aliam ejus demonstrationem. Ex *K* ducantur *Km* ad *CP* & *Kn* ad *CI* parallelæ. Et ob æquiangula triangula *ICP*, *IKN*, *nKm*, Item quæ ob *IKm* & *Ipp* æquiangula. Erit,

$$Ip \text{ vel } IP : IK :: pP : Km$$

$$PC : IP :: Km : mn$$

$$IN : IK :: mn : nK \text{ unde ex æquo}$$

$$\text{fiet } PC \times IN : IK^2 :: pP : nK; \text{ \& erit } nK = \frac{pP \times IK^2}{PC \times IN}.$$

Præterea tempus quo describitur arcus *IK* est ut
Area

Area seu triangulum ICK , vel ejus duplum $PC \times IK$; adeoque si tempus detur erit $PC \times IK$ quantitas constans. Dato autem tempore, vis centripeta est ut lineola Kn quæ sub urgente vi illa describitur, adeoque vis centripeta est ut lineola

illa Kn ducta in quantitatem constantem $\frac{1}{PC^2 \times IK^2}$, hoc est,

erit vis centripeta ut $\frac{1}{PC^2 \times IK^2} \times \frac{Pp \times IK^2}{PC \times IN}$ seu ut quantitas

$\frac{Pp}{PC \times IN}$. Quod erat demonstrandum.

Velocitas corporis in quovis loco est ut via in minimo quovis tempore percursa directè & ut tempus illud inversè;

adeoque & ut $IK \times \frac{1}{PC \times IK}$, hoc est, velocitas erit reciprochè ut Perpendicularis è centro in Tangentem.

Si distantia corporis à centro dicatur x , & Perpendicularis in tangentem p , erit $IN = \dot{x}$ & $Pp = \dot{p}$ & vis centripeta exponi

potest per quantitatem $\frac{f^4 \dot{p}}{p^3 x}$, assumendo quantitatem quamlibet pro f^4 .

Adeoque si cum Domino Bernoullio vim centripetam nominemus ϕ , erit $\frac{f^4 \dot{p}}{p^3 x} = \phi$ & $\frac{f^4 \dot{p}}{p^3} = x \phi$; & capiendo harum quan-

titatum fluentes erit $\frac{f^4}{2p^2} =$ Fluenti quantitatis $x \phi$

At cum velocitas corporis sit reciprochè ut perpendicularis p , ejus quadratum exponi potest per $\frac{f^4}{2p^2}$. Si itaque velocitas

dicatur v , erit $v^2 = \frac{f^4}{2p^2} =$ Fluenti quantitatis $x \phi$. Quod si

A sit locus de quo cadere debet corpus ut acquirat in D vel I veloci-

velocitatem v , deque loco corporis D erigatur perpendicularis $DF = \varphi$ erit rectangulum $DE \times DF = x \varphi$. Sit jam $BF G$ linea curva cujus ordinatæ exponant vires centripetas, seu quantitates φ . Fluens quantitatis $x \varphi$ erit Area curvilinea $ABFD = v^2 = \frac{f^4}{2p^2}$, adeoque erit v ut Areæ $ABFD$ latus quadratum. Quod si velocitas ea sit quæ ab infinita distantia cadendo acquiritur, erit v^2 seu fluens ipsius $x \varphi$ æquale areæ $ODFO$ indefinitè protensæ.

Hinc semper dabitur quantitas p in terminis finitis, quando Area illa curvilinea terminis finitis exponi potest. Sit, verbi gratia, vis centripeta reciprocè ut distantie dignitas m , hoc est, sit $x \varphi = \frac{g x}{x^m}$. Si velocitas corporis sit ea quæ acquiritur

cadendo ab infinita distantia, erit $v^2 = \frac{g}{m-1 \times x^{m-1}} = \frac{f^4}{2p^2}$ & in

hiscæ omnibus casibus Area indefinitè protensa est quantitas finita. Potest autem corpus in trajectory revolvi velocitate cujus quadratum vel majus fieri potest, vel minus quantitate

$\frac{g}{m-1 \times x^{m-1}}$, vel huic æquale. Adeoque erit $v^2 = \frac{f^4}{2p^2} =$

$$\frac{g}{m-1 \times x^{m-1}} + e^2$$

Hinc urgentibus his viribus, tria Curvarum genera describi possunt; prout e^2 est quantitas positiva vel negativa vel nulla.

V.G. Si Velocitas major sit ea quæ acquiritur ab infinita distantia cadendo, sit $\frac{f^4}{2p^2} = \frac{g}{m-1 \times x^{m-1}} + e^2$: si velocitas sit minor

erit $\frac{f^4}{2p^2} = \frac{g}{m-1 \times x^{m-1}} - e^2$: si æqualis, erit $\frac{f^4}{2p^2} = \frac{g}{m-1 \times x^{m-1}}$

Sit

Sit $\frac{1}{2} f^4 = a^2 e^2$ & $\frac{1}{m-1} \times g = b^2 e^2$. Et si velocitas corporis sit ea quæ ab infinito cadendo acquiritur, erit $p^2 = \frac{a^2 x^{m-1}}{b^2}$
 seu $p = \frac{a x^{\frac{m-1}{2}}}{b}$.

At si velocitas major sit aut minor hac velocitate, fiet uti ostensum est $\frac{f^4}{2p^2} = \frac{g}{m-1 x^{m-1}} + e^2 = \frac{\frac{1}{m-1} g + e^2 x^{m-1}}{x^{m-1}}$. Unde pro $\frac{1}{2} f^4$ & $\frac{g}{m-1}$ ponendo earum valores $a^2 e^2$ & $b^2 e^2$, erit $\frac{a^2 e^2}{p^2} = \frac{b^2 e^2 + e^2 x^{m-1}}{x^{m-1}}$ seu $\frac{a^2}{p^2} = \frac{b^2 + x^{m-1}}{x^{m-1}}$, & fiet $p^2 = \frac{a^2 x^{m-1}}{b^2 + x^{m-1}}$.

Adeoque si Vis centripeta sit reciprocè ut cubus distantia, hoc est, si sit $m = 3$ & $m - 1 = 2$. Erit $p^2 = \frac{a^2 x^2}{b^2}$, vel $p = \frac{a x}{b}$, vel denique $p^2 = \frac{a^2 x^2}{b^2 + x^2}$.

In primo casu constat Curvam esse Spiralem Logarithmicam : nam sit $p = \frac{a x}{b}$, & $b : a :: x : p$. adeoque ob constantem rationem b ad a , erit angulus CIP ubique constans.

Ponamus jam esse $p^2 = \frac{a^2 x^2}{b^2 + x^2}$ & ex hac suppositione tres oriuntur diversæ Curvarum species, prout a major est quam b , aut ei æqualis, aut minor. *Fig. III.*

Et primo sit a major quàm b . Centro C & ad distantiam quamvis datam describatur circulus HTX , cui rectæ CK , CI productæ occurrant in T & X . Et est $IN^2 : KN^2 :: IP^2 : PC^2$
 P & ita

& ita $CP^2 - PC^2 : PC^2 :: x^2 - p^2 : p^2 :: x^2 - \frac{a^2 x^2}{b^2 + x^2} : \frac{a^2 x^2}{b^2 + x^2} :: 1 - \frac{a^2}{b^2 + x^2} : \frac{a^2}{b^2 + x^2} :: b^2 + x^2 - a^2 : a^2$. Quare erit $\sqrt{x^2 + b^2 - a^2} : a :: IN : KN : x : \frac{ax}{\sqrt{x^2 + b^2 - a^2}} = KN$. Et quoniam est a major quam b , erit $b^2 - a^2$ quantitas negativa. Sit illa $-c^2$, unde fit $KN = \frac{ax}{\sqrt{x^2 - c^2}}$. Dicatur radius circuli HT h , & est $CK : KN :: CT : TX$ hoc est $x : \frac{ax}{\sqrt{x^2 - c^2}} :: h : \frac{hax}{x\sqrt{x^2 - c^2}} = TX = y$, si arcus HT vocetur y .

Sit $x = \frac{c^2}{z}$ unde $\dot{x} = -\frac{c^2 \dot{z}}{z^2}$ & $\frac{\dot{x}}{x} = -\frac{\dot{z}}{z}$. Item erit $x^2 - c^2 = \frac{c^4}{z^2} - c^2 = \frac{c^4 - c^2 z^2}{z^2} = \frac{c^2}{z^2} \times c^2 - z^2$: unde $\sqrt{x^2 - c^2} = \frac{c}{z} \times \sqrt{c^2 - z^2}$: quibus valoribus substitutis, erit $\frac{hax}{x\sqrt{x^2 - c^2}} = -\frac{haz}{c\sqrt{c^2 - z^2}}$. Sit $a : c :: n : 1$. hoc est, sit $a = nc$, & fiet XY seu $y = -\frac{nb\dot{z}}{\sqrt{c^2 - z^2}}$. Est verò $\frac{nb\dot{z}}{\sqrt{c^2 - z^2}}$ ad $\frac{c\dot{z}}{\sqrt{c^2 - z^2}}$ ut nb ad c ; hoc est in ratione data : adeoque eorum fluentes, si simul incipiunt, erunt in eadem ratione, hoc est erit HT seu y ad fluentem quantitatem $\frac{c\dot{z}}{\sqrt{c^2 - z^2}}$ ut nb ad c .

Quod si centro C radio $CV = c$ describatur circulus VL , & CG sit z , & $no = \dot{z}$, fiet arcus $mn = \frac{c\dot{z}}{\sqrt{c^2 - z^2}} =$ fluxioni arcus Qm , quando fluxio est quantitas positiva : sed quando est negativa

tiva, ejus fluens est arcus Vm prioris complementum. Arcus enim ejusque complementum eandem habent quantitatem fluxionem denotantem, diversis tantum signis affectam ; quia crescente uno decrescit alter.

Hinc est HT ad Vm ut nh ad c : sed est CV ad CH ut Ve : HT , hoc est $c : b :: Ve : \frac{b \times Ve}{c} = HT$, quare erit $\frac{b \times Ve}{c} : Ve :: nh : c$, unde $Ve : Vm :: n : 1$.

Præterea ex natura circuli erit $CG : CV :: CV : CT$, quando mT circulum tangit : hoc est erit $x : c :: c : \frac{c^2}{x} =$

$CT = x$. Hinc si capiatur angulus VCe ad angulum VCm ut n ad 1 , & producat Ce ad K ut sit $CK =$ secanti CT , erit K punctum in Curvâ quæsitâ.

Hic obiter notandum est, si n sit numerus, hoc est si sit a ad c vel a ad $\sqrt{a^2 - b^2}$ ut numerus ad numerum, Curva VI fiet Algebraica: nam in hoc casu relatio mG ad sinum anguli VCe æquatione definitur, & inde habebitur relatio sinus anguli VCe ad CT vel CK per æquationem determinatam, & inde demum dabitur æquatio quæ exprimet relationem inter ordinatam & interceptam à puncto C incipientem. Harum Curvarum ordines & gradus in Scala æquationum Algebraica diversi erunt pro magnitudine numeri n . In his omnibus Curvis sic descriptis Asymptoti positio hac ratione determinatur: Fiat angulus $VC L$ ad rectum angulum ut n ad 1 . In eo angulo distantia corporis à centro evadit infinita. Jam quad. perpendicularis in Tangentem $PC = \frac{a^2 x^2}{b^2 + x^2}$, ubi x est infinita, fit $PC =$

$\frac{a^2 x^2}{x^2}$, seu $PC = a$. Ducatur itaque CR ad CL perpendicularis & æqualis rectæ a , & si per R ducatur RS rectæ CL parallela, hæc Curvam tanget ad infinitam distantiam, seu erit Curvæ Asymptotos.

Si corpus in quavis harum Curvarum descendendo, ad Apfidem imam pervenerit ; Hinc rursus ascendet in infinitum,

& aliam Curvam priori similem, seu potius ejusdem Curvæ similem portionem, ascendendo describet.

Curvæ hæc possunt pluribus revolutionibus circa centrum torqueri, priusquam ad Asymptoton convergere incipiant, & motus angularis rectæ CK erit æqualis totidem rectis quot numerus n constat Unitatibus. v. g. si n sit 100, perficientur viginti quinque integræ revolutiones priusquam distantia à centro evadat infinita.

Aucto numero n , eadem manente a , minuitur c : est enim $\frac{a}{n}$

$\Rightarrow c$ & $\frac{a^2}{n^2} = c^2 = a^2 - b^2$, unde fiet $n^2 - 1 \times a^2 = n^2 b^2$. Et pro-

inde fiet $a^2 : b^2 :: n^2 : n^2 - 1$; adeoque si b^2 ad æqualitatem accedat ipsius a^2 , perveniet quoque $n^2 - 1$ ad rationem æqualitatis cum n^2 , & proinde augebitur n & in eadem ratione minuetur c . Ponatur itaque esse b^2 fere æquale ipsi a^2 ; adeo ut cum differentia sit infinite parva, fiat n numerus infinite magnus, & radius circuli c fiet infinite parvus, seu circulus in suum centrum contrahetur. At sic evanescente c , non pariter evanescit CT , si angulus PCM sit propemodum rectus: nam in omni circulo, etiam minimo, secans anguli recti est quantitas infinita. Curva itaque hæc, ob n numerum infinitum, infinitis numero revolutionibus centrum ambibit, priusquam ad Asymptoton convergere incipiet.

Evanescente autem c fit $b = a$ & $p = \frac{a \cdot x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$. Et quoni-

am in omni casu est $y = \frac{h a x}{x \sqrt{x^2 + c^2}}$, evanescente c fiet $y = \frac{h a x}{x^2}$, unde capiendo Fluentes fiet $y = \frac{h a}{x}$ seu $xy = h a = \text{data}$

quantitati. *Fig. IV.*

Hæc Curva est Spiralis Hyperbolica, quæ plures habet notabiles proprietates. Si ducatur radius quilibet CI Curvæ occurrens in I , & peripheriæ circuli in T , & ex C ad CI excitetur perpen-

perpendicularis CT , atque IT tangat Curvam in I , & rectæ CT occurrat in T : erit CT constans recta, æqualis scilicet arcui VE ; qua proprietate Logarithmicam æmulatur, cum CT Curvæ Subtangens dici possit. Sit enim Radius circuli $CE = b$, arcus $VE = a$, dicatur $CI = x$ & VT sit y . Quia est $ba = x \times y$ erit $\frac{ba}{x} = y$ & $\frac{ba}{x^2} = \frac{y}{x}$. Porro est $CT : CI :: TX : NK$

hoc est $b : x :: \frac{ba}{x^2} : NK$: quæ proinde est $\frac{a}{x}$. Et quoniam

est $IN : NK :: CI : CT$. hoc est $x : \frac{a}{x} :: x : CT$, erit $CT = a$.

Si centro C , intervallo quovis CG , describatur circuli arcus GF , hic arcus inter rectam CV & curvam interceptus erit semper æqualis constanti rectæ CT vel a . Nam quoniam est $VL \times CF = CV \times VE$, erit $VL : VE :: CV : CF :: VL : GF$ unde æquantur VE & GF . Si ad CG ex C exciterur normalis $CR = VE$ vel FG vel a , & per R agatur RS rectæ CV parallela, erit RS Curvæ Asymptotos. Nam est recta MS æqualis arcui GF , & proinde FS distantia Curvæ ab RS est semper æqualis excessui quo arcus superat suum sinum: at cum distantia crescat in infinitum, excessus ille minuetur in infinitum, & fiet tandem data quavis recta minor, & proinde RS erit Curvæ Asymptotos.

Sit jam b major quam a ; & similiter, ut in priore casu, invenietur $KN = \frac{ax}{\sqrt{x^2 + b^2 - a^2}}$: at quoniam b superat a , erit c^2

$= b^2 - a^2$ quantitas positiva, & KN fiet $= \frac{ax}{\sqrt{x^2 + c^2}}$ & ponendo

radius circuli $HT = b$, invenietur $XT = \frac{bax}{x\sqrt{x^2 + c^2}}$. Pona-

tur $x = \frac{z^2}{c}$, & erit $\frac{z^2}{c} = -\frac{c^2 z}{z^2}$ & $\frac{z}{c} = -\frac{z}{z}$. Erit quoque $x^2 =$

$\frac{c^4}{z^2}$ & $x^2 + c^2 = \frac{c^4}{z^2} + c^2 = \frac{c^4 + c^2 z^2}{z^2} = \frac{c^2}{z^2} \times c^2 + z^2$: unde

$$\sqrt{x^2 + c^2}$$

$\sqrt{x^2 + c^2} = \frac{c}{z} \times \sqrt{c^2 + z^2}$. His itaque valoribus substitutis fit

$$\frac{b a \dot{x}}{x \sqrt{x^2 + c^2}} = - \frac{b a \dot{z}}{c \sqrt{c^2 + z^2}} = -j. \text{ Nam tale sumi potest ini-}$$

tium arcus HT , ut simul cum Fluente quantitatis $\frac{-b a \dot{z}}{c \sqrt{c^2 + z^2}}$

crescat & decreseat. Fiat $nc = a$ & erit $\frac{n b \dot{z}}{\sqrt{c^2 + z^2}} = j$, &

$$\frac{\frac{1}{2} n b^2 \dot{z}}{\sqrt{c^2 + z^2}} = \frac{1}{2} b j = \text{sectori } CXT.$$

Est autem $\frac{\frac{1}{2} n b^2 \dot{z}}{\sqrt{c^2 + z^2}} : \frac{\frac{1}{2} c^2 \dot{z}}{\sqrt{c^2 + z^2}} :: n b^2 : c^2$, hoc est in

data ratione. Adeoque erit sector CXT ad $\frac{\frac{1}{2} c^2 \dot{z}}{\sqrt{c^2 + z^2}}$ sem-

per in data ratione. Harum itaque quantitatum fluentes erunt in eadem ratione, cum simul incipere ponantur. Fluens autem sectoris CXT est sector CVT , & fluens quantitatis

$\frac{\frac{1}{2} c^2 \dot{z}}{\sqrt{c^2 + z^2}}$ est sector Hyperbolæ, quod sic ostenditur. *Fig. V.*

Centro C semiaxe transverso $CV = c$ describatur Hyperbola æquilatera, & ex duobus punctis vicinis D & F ordinentur ad axem conjugatum rectæ DB , EF ; ducantur item CD , CF . Et incrementum seu fluxio trianguli BCD æquale erit $BE \times BD - \text{sector } DCF$: unde sector DCF (qui est Fluxio sectoris CVD) æqualis erit $BE \times BD - \text{incremento trianguli } BCD$. Et si BC dicatur z , ob Hyperbolam, est $BD^2 = BC^2 + CV^2 = z^2 + c^2$: unde $BD = \sqrt{c^2 + z^2}$, & $BE \times BD = z \times \sqrt{c^2 + z^2}$. Triangulum autem BCD est $\frac{1}{2} z \times \sqrt{c^2 + z^2}$, cujus fluxio est $\frac{1}{2} \dot{z} \times \sqrt{c^2 + z^2} + \frac{\frac{1}{2} z \times z^2}{\sqrt{c^2 + z^2}}$. Subtrahatur hæc quantitas ab $z \times \sqrt{c^2 + z^2}$, & restabit sector Hyperbolæ minimus CDT

$$= \frac{1}{2}z \times \sqrt{c^2 + z^2} - \frac{\frac{1}{2}z \times z^2}{\sqrt{c^2 + z^2}} = \frac{\frac{1}{2}z \times c^2 + z^3 - \frac{1}{2}z \times z^2}{\sqrt{c^2 + z^2}} =$$

$$\frac{\frac{1}{2}c^2 z}{\sqrt{c^2 + z^2}}. \text{ Adeoque fluens sectoris } CDF \text{ est æqualis fluenti}$$

$$\text{quantitatis } \frac{\frac{1}{2}c^2 z}{\sqrt{c^2 + z^2}}. \text{ Proinde erit sector } CVD \text{ fluens quan-}$$

$$\text{titatis } \frac{\frac{1}{2}c^2 z}{\sqrt{c^2 + z^2}}. \text{ Præterea } DT \text{ recta tangat Hyperbolam}$$

& occurrat Axi conjugato in T . Est ex natura Hyperbolæ BC :

$$CV :: CV : CT, \text{ hoc est } z :: c :: c : \frac{c^2}{z} = CT = x. \text{ At-}$$

que hinc oritur constructio quæ sequitur. *Fig. VI.*

Centro C semiaxe transverso CV , describatur Hyperbola æquilatera Vm , item circulus Ve . Capiatur sector circularis CVe ad sectorem Hyperbolicam CVm ut n ad 1 ; tangat Hyperbolam in m recta Tm , occurrens Axi conjugato in T : producat Ce ad k ut sit $Ck = CT$, & punctum k erit in Curva quæsitâ. Nempe talis est ea Curva, ut si Ck dicatur x , Perpendicularis à C

in tangentem ejus demissa erit semper æqualis $\frac{ax}{\sqrt{b^2 + x^2}}$.

Quando x est infinita evanescit b^2 , & perpendicularis fit $= a$, & tunc coincidit CR cum CV . Si itaque capiatur in axe conjugato $CR = a$, & ducatur RS ipsi CV parallela, erit hæc Curvæ Asymptotos.

Si eo usque augeatur a ut fiat quantitas $b^2 - a^2$ infinite parva, tunc evanescet c^2 , & quantitas $\frac{bax}{x\sqrt{x^2 + c^2}}$ fit $\frac{bax}{x^2} = y$. Unde si capiantur harum quantitatum fluentes, habebimus $x = y$, & $ba = xy$, hoc est rectangulum sub arcu circulari & distantia Curvæ à centro erit semper data quantitas; atque hac ratione migrabit curva in spiralem Hyperbolicam. Est itaque spiralis Hyperbolica Curva media seu quasi limes, inter eas Curvas quæ construuntur per sectores circulares & eas quæ construuntur per sectores Hyperbolicos. Itaque spiralis illa Hyperbolica concipi-

pi potest formari vel per sectorem Circuli aut Ellipsis, vel per sectorem Hyperbolæ, cujus Axis transversus minuitur in infinitum, & in eadem ratione augetur numerus n .

Ad eum jam devenimus casum ubi velocitas corporis minor est eâ quæ acquiritur cadendo ab infinita distantia, & ubi $p^2 =$

$$\frac{a^2 x^2}{b^2 - x^2}. \text{ Et hic simili ratiocinio ac in priori casu, invenie-}$$

$$\text{tur } KN = \frac{a \dot{x}}{\sqrt{b^2 - a^2 - x^2}}, \text{ ubi necesse est ut sit } b^2 \text{ majus quam}$$

$$a^2. \text{ Hinc si } b^2 - a^2 \text{ dicatur } c^2, \text{ fit } KN = \frac{a \dot{x}}{\sqrt{c^2 - x^2}}; \text{ \& proinde}$$

$$XT \text{ seu } y = \frac{h a \dot{x}}{x \sqrt{c^2 - x^2}};$$

$$\text{Sit jam } x = \frac{c^2}{z}, \text{ \& fiet } \frac{\dot{x}}{x} = - \frac{\dot{z}}{z} \text{ seu } \frac{h a \dot{x}}{x} = - \frac{h a \dot{z}}{z} \text{ \&}$$

$$c^2 - x^2 \text{ erit } = \frac{c^2}{z^2} \times z^2 - c^2, \text{ quibus valoribus substitutis fit}$$

$$- \frac{h a \dot{z}}{c \sqrt{z^2 - c^2}} = \frac{h a \dot{x}}{x \sqrt{x^2 - c^2}} = - y. \text{ Nam tale ponendum est}$$

initium arcus VX , ut simul cum fluente quantitatis

$$\frac{h a \dot{z}}{c \sqrt{z^2 - c^2}} \text{ incipiat: unde erit } \frac{\frac{1}{2} h^2 a \dot{z}}{c \sqrt{z^2 - c^2}} = \frac{1}{2} h y = \text{sectori}$$

$$CXT = \frac{\frac{1}{2} n h^2 \dot{z}}{\sqrt{z^2 - c^2}}, \text{ ponendo } n c = a. \text{ Est vero } \frac{\frac{1}{2} n h^2 \dot{z}}{\sqrt{z^2 - c^2}}$$

$$\text{ad } \frac{\frac{1}{2} c^2 \dot{z}}{\sqrt{z^2 - c^2}} \text{ ut } n h^2 \text{ ad } c^2, \text{ hoc est in ratione constanti. Qua-}$$

re harum quantitatum Fluentes sunt in eadem ratione, hoc est

$$\text{Fluens quantitatis } \frac{1}{2} h y \text{ seu } \frac{\frac{1}{2} n h^2 \dot{z}}{\sqrt{c^2 - z^2}} \text{ erit ad fluentem quanti-}$$

$$\text{tatis } \frac{\frac{1}{2} c^2 \dot{z}}{\sqrt{z^2 - c^2}} \text{ ut } n h^2 \text{ ad } c^2. \text{ Est autem fluens quantitatis}$$

$\frac{1}{2} h y = \text{sectori } CVX$, & Fluens quantitatis $\frac{\frac{1}{2} c^2 z}{\sqrt{z^2 - c^2}}$ est sector

Hyperbolæ, quod sic ostenditur. *Fig. VII.*

Centro C semiaxe transverso $CV = c$ describatur Hyperbola æquilatera, & ex duobus punctis infinite vicinis B & D ad axem ordinentur dux rectæ BE , DF ; ducantur item CB , CD . Et erit Fluxio seu incrementum trianguli $CBE = \text{triangulo } CBD + BE \times EF$; unde triangulum CBD , seu sector minimus CBD , erit = incremento trianguli $CBE - BE \times EF$. Dicatur $CE = z$, & erit $BE = \sqrt{z^2 - c^2}$, & $BE \times EF = z \cdot \sqrt{z^2 - c^2}$. Est quoque triangulum $CBE = \frac{1}{2} z \sqrt{z^2 - c^2}$,

cujus Fluxio est $\frac{1}{2} z \times \sqrt{z^2 - c^2} + \frac{\frac{1}{2} z \times z^2}{\sqrt{z^2 - c^2}}$; à quo si subtra-

hatur quantitas $z \times \sqrt{z^2 - c^2}$, fit sector minimus $CBD =$

$$\frac{\frac{1}{2} z \times z^2}{\sqrt{z^2 - c^2}} - \frac{1}{2} z \times \sqrt{z^2 - c^2} = \frac{\frac{1}{2} z \times z^2 - \frac{1}{2} z \times \sqrt{z^2 - c^2}^2}{\sqrt{z^2 - c^2}} =$$

$\frac{\frac{1}{2} c^2 z}{\sqrt{z^2 - c^2}}$: unde constat sectorem CBE esse fluentem quan-

titatis $\frac{\frac{1}{2} c^2 z}{\sqrt{z^2 - c^2}}$. Præterea si BT tangens Hyperbolam Axii transverso occurrat in T , ex natura Hyperbolæ fit $CE : CV :: CV : CT$, hoc est $z : c :: c : \frac{c^2}{z} = CT = x$. *Fig. VIII.*

Hinc deducimus sequentem constructionem. Centro C , semiaxe transverso $CV = c$, describatur Hyperbola æquilatera VB , & circulus CeG ex centro C . Ad hyperbolam ducatur recta CB , & hyperbolæ Tangens BT axi transverso occurrat in T . Capiatur circuli sector CVe , qui sit ad sectorem Hyperbolicum CVB ut n ad 1 . In Ce capiatur $CK = CT$, & erit K punctum in Curva quæsitâ, cujus perpendiculum è centro C ad Tangentem in K demissum, si CK dicatur x , est æquale

$$\frac{a v}{\sqrt{b^2 - x^2}}$$

Et in hac Curva, urgente vi centripeta quæ sit reciproce ut cubus distantia, movebitur corpus, si secundum directionem Tangentis cum iusta velocitate exeat. Qualis autem debet esse velocitas quæ faciat ut corpus harum Curvarum quamvis describat, sic invenietur.

Cum velocitas qua corpus in trajectoria quacunque movetur sit reciproce ut quantitas p , assumendo constantem quamvis a , ea semper exponi potest per $\frac{a}{p}$. Et si ad Axem CV ordinentur rectæ quæ sint reciproce ut cubi distantiarum à centro, seu ut vires centripetæ, & hac ratione formetur Figura curvilinea, ejus Area indefinite extensa semper exponi potest per $\frac{b^2}{x^3}$, ut ex Quadraturis constat. At Area illa est ut quadratum velocitatis quæ acquiritur ab infinita distantia cadendo, adeoque velocitas hoc casu acquisita erit ut $\frac{b}{x}$. Hinc si velocitas illa dicatur y , & velocitas qua corpus in Trajectoria movetur dicatur v , talesque assumantur quantitates a & b , ut in una aliqua à centro distantia sit $y : v :: \frac{b}{x} : \frac{a}{p}$, erit ubique in omnibus distantiiis $y : v :: \frac{b}{x} : \frac{a}{p} :: p : \frac{ax}{b}$. Unde si $y = v$, erit $p = \frac{ax}{b}$, & Curva hac velocitate descripta erit Spiral Nautica; vel Circulus existente $p = x$ & $a = b$.

Si y sit major quam v , tunc p major erit quam $\frac{ax}{b}$; eritque illa, ut ex præcedentibus constat, $= \frac{ax}{\sqrt{b^2 - x^2}}$. Curva autem construetur per sectorem Hyperbolicum, ut in ultimo casu ostensum fuit, ubi distantia corporis à centro per concursum Tangentis Hyperbolæ cum Axe transverso determinatur. Si

y fit minor quam v , at in tantilla ratione ut maneat b major quam a , Curva formabitur per eundem sectorem hyperbolicum. At distantia corporis à centro desumitur ex concursu Tangentis cum Axe conjugato:

Si fit $y : v :: p : x$, erit in eo casu $a = b$, & Curva evadit Spiralis Hyperbolica, ubi est $p = \frac{ax}{\sqrt{a^2 + x^2}}$. Hinc si de loco

quovis projiciatur corpus secundum datam rectam, cum ea velocitate quæ sit ad velocitatem ab infinito cadendo acquisitam, ut distantia corporis à centro ad perpendicularem è centro ad lineam directionis demissam, movebitur illud corpus in Spirali Hyperbolica. Si denique sit v tantò major quam y , ut sit etiam a major quam b , Curva construetur per Sectores Circulares. Atque hac ratione datâ velocitate semper determinari possit relatio quantitatum a & b , ac proinde Curva describetur in qua corpus cum illa velocitate movebitur: & vicissim data Curva, seu datis quantitibus a & b , invenietur velocitas qua Curva illa describitur.

Omnium Curvarum Areæ (si circulum excipias) quæ urgente hac vi centripetâ describi possunt, sunt perfecte quadrabiles.

Nam primo, in spirali Logarithmica, quia est $p = \frac{ax}{b}$, erit

$$KN = \frac{ax}{\sqrt{b^2 - a^2}} = \frac{ax}{c}, \text{ ponendo } b^2 - a^2 = c^2: \text{ vid. Fig. II.}$$

adeoque erit triangulum $CKI = \frac{\frac{1}{2} axx}{c}$; cujus Fluens est

$$\frac{ax^2}{4c} = \text{Areæ Curvæ.}$$

Si p fit $\frac{ax}{\sqrt{b^2 + x^2}}$, & a major quam b , ostensum est esse $KN = \frac{ax}{\sqrt{x^2 - c^2}}$, unde $KN \times \frac{1}{2} CI = \frac{\frac{1}{2} axx}{\sqrt{x^2 - c^2}}$, cujus Fluens est $\frac{1}{2} ax \sqrt{x^2 - c^2} = \text{Areæ Curvæ.}$ At si a minor sit quam b , fit $KN =$

$\frac{ax}{\sqrt{x^2+c^2}}$, & $KN \times \frac{1}{2} CI = \frac{\frac{1}{2} axx}{\sqrt{x^2+c^2}}$, cujus Fluens est $\frac{1}{2} a$
 $\sqrt{x^2+c^2} - Q = \text{Areæ Curvæ}$. Ponatur $x=0$, & fiet $\frac{1}{2} ac -$
 $Q = 0$, unde $Q = \frac{1}{2} ac$, & Area Curvæ fit $= \frac{1}{2} a \sqrt{x^2+c^2} -$
 $\frac{1}{2} ac$.

In Spirali Hyperbolica evanescit quantitas c , & Area Curvæ
 fit $\frac{1}{2} ax$.

Si p fit $= \frac{ax}{\sqrt{b^2-x^2}}$, ostensum est esse $KN = \frac{ax}{\sqrt{c^2-x^2}}$, un-

de $\frac{1}{2} CI \times KN = \frac{\frac{1}{2} axxx}{\sqrt{c^2-x^2}}$, cujus fluens est $Q - \frac{1}{2} a \sqrt{c^2-x^2}$
 $= \text{Areæ}$. Fiat $x=0$, & erit $Q - \frac{1}{2} ac = 0$, seu $Q = \frac{1}{2} ac$;
 unde erit Area Curvæ semper æqualis $\frac{1}{2} ac - \frac{1}{2} a \sqrt{c^2-x^2}$.
 Fiat $c^2 - x^2 = 0$ seu $c = x$, & Area curvæ fit $\frac{1}{2} ac$. Unde
 si initium Areæ non capiatur ab initio ipsius x , seu ubi x est
 $= 0$, sed ubi $x = c$ est maxima, hoc est si Area ab V incipiat,
 (vid. Fig. VII.) erit Area semper æqualis $\frac{1}{2} a \sqrt{c^2-x^2}$.

De Areis quas describunt corpora radiis ad centrum ductis,
 urgente vi centripeta quæ fit reciproce ut distantiarum cubi,
 sequentia adnotavit Collega meus peritissimus Geometriæ
 Professor Halleius. Nempe si corpora diversos circulos vel di-
 versas Spirales Hyperbolicas hac lege describunt; erunt areæ
 sectorum, tam in Circulis quam in Spiralibus illis omnibus,
 æqualibus temporibus descriptæ, semper æquales: Nam veloci-
 tates corporum in circulis motorum secundum hanc legem, de-
 bent esse radiis seu distantiiis reciproce proportionales, adeoque
 arcus simul percursum erunt quoque in eadem radorum reci-
 procâ ratione, unde statim patebit sectores simul descriptos
 esse æquales.

In reliquis omnibus Curvis cum sit velocitas ad velocitatem
 corporis in eadem distantia in circulo moti ut $\frac{a}{b} \times x$ ad p , (vide

Fig. III.) seu ut $\frac{a}{x} \times IK$ ad KN ; interea dum corpus in Trajecto-

ria percurrit lineolam IK , corpus aliud in circulo in eadem distantia motum percurrent arcum $\frac{b}{a} \times KN$; & Area sectoris

Circuli & Trajectoriæ simul descriptæ erunt $\frac{b}{a} \times KN \times \frac{1}{2} CN$

& $KN \times \frac{1}{2} CN$, quæ duæ Areæ sunt in ratione data, scil. ut b ad a . Adeoque ubi est $a = b$, uti fit in Spirali Hyperbolica, Area sic descripta erit semper æqualis Areæ sectoris circularis in æquali tempore descriptæ.

November 24. 1713

III. *Rules for correcting the usual Methods of computing Amounts and present Values, by Compound as well as Simple Interest; and of stating Interest Accounts. Offer'd to Consideration, by Thomas Watkins, Gent. F. R. S.*

I. Of Compound Interest.

THE Supposition whereon the Method of computing by Compound Interest is founded; *viz.* That all Interest Money, Rents, &c. are or may be constantly receiv'd, and put out again at Interest, the Moment they become due, without any Charge, or Trouble, being impracticable; therefore all Computations by this Method (except of Fee-Simples or other Perpetuities) must needs be erroneous: Thus for Instance, the Amount of a Sum of Money, or Annuity, for want of Deductions out of the Profits, for the unavoidable Trouble, Charge, and Delay in the Management, will be too great: and for the same reason, the present value of a Sum of Money payable in any time to come, will be too little; also the present value of an Annuity (being only the Amount of the difference between the Annuity, and Interest of the said present value) will be too much. But in long terms of Years, as that difference becomes less so does the Error, as the term is great.